

Avertissements agricoles



PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Bulletin N°10

3 Mai 1984

ARBORICULTURE

TOUTES ESPECES

ACARIENS ROUGES -

Les éclosions ont atteint 50 % à la fin Avril dans les régions de basse et moyenne altitude . En vergers non traités et si nécessaire, on interviendra dès réception avec un produit à base de tétrasil (Animert) : 40 g de M.A./hl .Ou avec un insecticide spécifique lorsqu'on observera 65 % des feuilles de Pommier ou de Pêcher occupées par des formes mobiles ou une moyenne de 2 formes mobiles par feuille de Poirier .

PUCERONS -

Surveiller leur présence. En cas d'enroulement des feuilles, utiliser un aphicide spécifique pénétrant comme pirimicarbe (Pirimor) ou endothérapique comme ométhoate (Folimate) .Ce dernier est également efficace sur *acariens* et *chenilles* .

SCOLYTES, XYLEBORES -

En vergers atteints en 1983, on interviendra dans la première quinzaine du mois avec un insecticide à action persistante tel lindane (nombreuses spécialités) ou oléoparathion (nombreuses spécialités) : 30 g de M.A./hl + huile .

ARBRES A PEPINS

TAVELURES DU POMMIER et DU POIRIER -

Attention aux prochaines pluies, les projections d'ascospores pouvant actuellement être importantes .Maintenir la protection également valable contre la *Septoriose* du poirier .

En cas de doute après une pluie sur vergers non protégés, se reporter à notre bulletin N°5 du 22 Mars 1984 précisant le risque de contamination et les produits à employer .Ou pour ceux pratiquant des traitements "stop" en Vaucluse et Bouches-du-Rhône téléphoner au (90) 87.41.62 .

CARPOCAPSE DES POMMES et DES POIRES -

Les premières captures ont été réalisées en régions de basse et moyenne altitude .

Si on utilise le diflubenzuron (Dimilin) : 10 g de M.A./hl, le premier traitement sera à effectuer dès maintenant dans les régions ci-dessus .

Si on utilise un insecticide classique (larvicide) un avis ultérieur en précisera les dates d'application .

OIDIUM -

Maintenir la protection sur pommiers .Préférer le soufre mouillable sur Golden comme préventif .

P284

MINEUSE MARBREE -

Le vol débute; il est encore trop tôt pour intervenir .

ARBRES A NOYAU

MONILIA -

Sur *Abricotier* et éventuellement *Pêcher*, on éliminera si possible les rameaux séchés après attaque du *Monilia* .

Sur *Cerisier*, en cas de risque de pluie ou de forte humidité, on effectuera, principalement sur variétés sensibles (ex. Moreau), un traitement dix jours avant récolte avec iprodione (Rovral, Kidan) : 75 g M.A./hl ou triforine (Saprol) : 35 g M.A./hl .

OIDIUM -

Commencer la protection des pêchers en vergers sensibles dès le grossissement des fruits .

AMANDIER - PECHER -

Afin de mieux comprendre les causes d'échecs dans la lutte contre les chancres à *Fusicoccum amygdali*, nous recherchons les vergers qui présenteraient actuellement des dépérissements de rameaux de un an ou des dessèchements de fleurs et de jeunes pousses . Nous remercions les arboriculteurs concernés de bien vouloir nous contacter .

CULTURES LEGUMIERES

PLEIN CHAMP

MOUCHE DU CHOU SUR NAVET -

Le vol se termine en zone précoce .

Sur les navets désinsectisés au semis depuis plus de deux mois, renouveler le traitement conseillé dans notre bulletin N°6 .

Ne pas traiter les navets récoltés avant le 18 Mai .

MOUCHE DE L'OIGNON -

En toutes zones renouveler le traitement conseillé dans notre bulletin N°7 .

MILDIOU DE L'OIGNON -

Rappel cf bulletin N°7 .

TEIGNE DU POIREAU -

Rappel cf bulletin N°9 .

MOUCHE DE LA CAROTTE -

Vol nul .